Planes de ejemplo

Lorazepam: *un plan de ejemplo*

Benzodiacepina. Un ejemplo de reducción proporcional para hablarlo con quien te receta, con lo que conviene saber de este fármaco en España.

Nunca de golpe
La retirada brusca de una benzodiacepina puede provocar convulsiones. Y nunca con alcohol: juntos deprimen la respiración, sobre todo durante el sueño.

Esto es un ejemplo, no una pauta
Muestra cómo se vería una reducción proporcional desde una dosis habitual, con el mismo cálculo que el simulador de tuescalera.org. No te dice cuándo ni cuánto cambiar tu dosis: llévalo a tu consulta y decidid juntos el ritmo. Si un paso no se tolera, no se sigue bajando: se mantiene la dosis o se vuelve a la anterior.

Lo que conviene saber

En España: Orfidal y genéricos. Comprimidos de 0,5, 1, 2 y 5 mg.

Forma líquida: No hay forma líquida comercializada. Para las dosis pequeñas, una farmacia puede preparar una fórmula magistral con receta o, con el médico, se puede valorar pasar a diazepam.

Vida media: Intermedia: 10–20 horas.

Equivalencia con diazepam: 1 mg ≈ 10 mg de diazepam. Equivalencia del manual Ashton: orientativa y variable entre personas.

- Nunca se deja de golpe: la retirada brusca puede provocar convulsiones. Consenso
- Muchas personas toleran bajar un 10 % de la dosis más reciente cada dos a cuatro semanas; quien la toma desde hace años puede necesitar ir más despacio. La última dosis antes de parar suele estar por debajo de 1 mg de diazepam equivalente. Consenso
- Se puede reducir directamente o pasar antes a diazepam, que se elimina más despacio y tiene forma líquida. Si se cambia, mejor de forma escalonada. La revisión Cochrane es tibia sobre este cambio. En debate
- Con las benzodiacepinas de acción corta o intermedia puede hacer falta repartir la dosis en más de una toma al día. Consenso
- El manual Maudsley lo considera de alto riesgo de síntomas de retirada. Consenso
- En España no existe en forma líquida. Para dosis pequeñas, fórmula magistral o, con el médico, paso a diazepam.

Un ritmo de ejemplo desde 1 mg al día

Cada paso quita un **10 % de la dosis anterior**, el ritmo que muchas personas toleran; se suele mantener cada dosis de dos a cuatro semanas. Son 43 pasos: unos 20 meses si mantienes cada dosis 2 semanas, y unos 40 si la mantienes 4. Quien la toma desde hace años puede necesitar ir más despacio, con pasos del 5 % o esperando de seis a ocho semanas; puedes verlo con tu cifra en el simulador. Las filas en granate son el **tramo final**. Las cifras están redondeadas: tu farmacéutica puede ajustarlas a lo que se puede medir.

Paso	mg	Paso	mg
Inicio	1	22	0,098
1	0,9	23	0,089
2	0,81	24	0,08
3	0,73	25	0,072
4	0,66	26	0,065
5	0,59	27	0,058
6	0,53	28	0,052
7	0,48	29	0,047
8	0,43	30	0,045
9	0,39	31	0,041
10	0,35	32	0,036
11	0,31	33	0,033
12	0,28	34	0,03
13	0,25	35	0,027
14	0,23	36	0,024
15	0,21	37	0,022
16	0,19	38	0,019
17	0,17	39	0,017
18	0,15	40	0,016
19	0,14	41	0,014
20	0,12	42	0,013
21	0,11	43	0

Lo que acordamos

Ritmo y semanas por paso

Empezamos el día

¿Paso previo a diazepam? Sí / No

Si aparecen síntomas, contacto

Fuentes: Presentaciones, concentraciones y dosificadores según las fichas técnicas de CIMA (AEMPS), consultadas el 3 de octubre de 2026 · Ashton CH, *Las benzodiacepinas: cómo actúan y cómo retirarlas* (Manual Ashton), 2002 · Taylor, Barnes y Young, *The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry* (2021) · Horowitz y Taylor, *The Maudsley Deprescribing Guidelines* (2024) · CADIME, *Deprescripción de benzodiazepinas* (2026)

Revisado el 27 de octubre de 2026. Este material es informativo: no sustituye a la consulta ni es una pauta individual. Cualquier cambio de dosis se decide con quien te receta.